

Elaborer une stratégie de traitement sélectif au tarissement

Réflexion à l'échelle du troupeau

Quels sont les points de vigilance pour que mon troupeau soit prêt au traitement sélectif au tarissement ?


- ✓ **Connaître le profil bactérien** du troupeau et s'assurer de l'absence de *Staphylococcus aureus* (*BactérioDéfect Tank* ou lait de petit mélange des vaches infectées).
- ✓ **Avoir des résultats au tarissement satisfaisants** (taux de guérison > 70 % et de nouvelles infections < 10 % : ATTENTION à affiner en fonction des effectifs).
- ✓ **Avoir un environnement sain** en début et fin de période sèche ainsi qu'autour du vêlage (>10m²/VT, absence de zones de suroccupation ou de zones souillées en extérieur, paillage et curage des aires paillées des taries assurant une température toujours < 35°C de la litière, pas de point d'eau accessible depuis l'aire paillée).
- ✓ **Gestion des mouches** en période estivale.
- ✓ **Anticiper les réformes** pour ne pas avoir de vaches infectées chroniques gestantes à tarir (lien avec le stade de gestation limite imposé par les abattoirs).

Vache >25L de lait, penser en 1^{er} lieu aux pratiques de réduction de production

[Voir Fiche](#)

Penser à utiliser le test plateau le jour du tarissement (Leucocyttest)

[Voir fiche](#)



Surveillance accrue des animaux/mamelles après tarissement
→ Eviter les tarissements avant WE

Elaborer une stratégie de traitement sélectif au tarissement

Réflexion à l'échelle de la vache

