

Un bon démarrage de campagne

- Comment sont produites ces données ?
- Dans un premier temps, faire un tour de sa surface à pâturer
- Respecter les transitions

	Croissance moyenne (KgMS/ha/jour) du 18/02 au 25/02/2022	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	11	6
Zone Intermédiaire	18	6,5
Zone Sud	Nord Loire	8,1
	Sud Loire	8,4
MOYENNE REGION	17	7,6

La pousse mesurée cette semaine est supérieure aux moyennes de saison mais c'est surtout une hauteur d'herbe déjà importante dans les champs qui pousse à se préparer à la mise à l'herbe (si cela n'est pas déjà fait).

Malgré la pousse hivernale favorisée par des températures plutôt douces, la pluviométrie pourrait se révéler comme limitante.



Comment sont produites ces données ?

A nouveau en 2022, La Chambre d'Agriculture et Seenovia vous proposent de faire un point hebdomadaire sur les mesures et observations faites sur les prairies dans la région. Ce sont 29 exploitations réparties dans les 5 départements qui sont au cœur de ce réseau. Chaque semaine, les hauteurs d'herbe y sont mesurées à l'herbomètre sur le circuit de pâturage. De la différence de hauteur d'une semaine sur l'autre en découle une différence de biomasse (dont la densité est mise à jour régulièrement au fil de l'année et qui est fonction de la prairie mesurée). Cette différence de biomasse permet le calcul d'une croissance de l'herbe. *Par exemple, pour une prairie de RGA/TB au mois de mars, on utilise la référence de 265 kg MS/cm/ha en termes de densité. Une croissance de 0,5 cm sur 7 jours donne alors : $(0,5 \text{ cm} \times 265) / 7 \text{ j} = 19 \text{ kg MS/ha/j}$.*

En **Gras** sur la carte, vous pouvez voir la moyenne des croissances obtenues pour chacune des exploitations suivies, quel que soit le type de prairie mesurée. Seules les prairies tout justes pâturées ou fauchées ne sont pas prises en compte.

Entre parenthèses, nous vous précisons les hauteurs moyennes obtenues lors de la dernière mesure, car la croissance est directement dépendante des hauteurs mesurées.

Nous produisons également des moyennes de croissance par zone. Ces zones (Nord, Intermédiaires et Sud, correspondant au dégradé de couleur), ont été définies selon des critères météo impactant sur la pousse de l'herbe. La zone Sud représentant la majorité du territoire a été séparée en deux « sous zones » : Nord et Sud de la Loire (zones sur lesquelles nous observons aussi des différences dans le comportement des prairies).

A partir du prochain bulletin, vous trouverez également une courbe, vous permettant de placer la croissance moyenne du moment et de l'année, par rapport à nos moyennes obtenues depuis 2000.

Dans un premier temps, faire un tour de sa surface à pâturer

L'hiver doux a permis une pousse de l'herbe assez importante et un état des lieux de l'herbe disponible sur le circuit de pâturage est primordial. De ce tour des prairies, vous devez pouvoir définir la part de pâturage possible dans la ration des animaux et la portance des parcelles.

On retiendra un objectif de fin du premier tour aux alentours du 1^{er} au 5 avril pour les zones Sud et du 15 avril pour les zones Intermédiaire et Nord. Une sortie au plus vite en échelonnant ce déprimage permettra de créer le décalage nécessaire entre les parcelles pour le reste de la saison. Une hauteur objectif de 4 cm herbomètre pour ce premier tour permettra de favoriser une repousse de qualité.

Priorisez les parcelles portantes pour la mise à l'herbe et ensuite celles dont la hauteur d'herbe est la plus importante. Le recours au fil avant peut se révéler très efficace pour assurer un bon ramassage de la biomasse tout en limitant de fortes variations d'ingestion (en quantité et en qualité) entre le premier et le dernier jour dans la parcelle. Si la portance devait se dégrader, des parcelles destinées à être mises en maïs pourront servir pour attendre le retour de la portance sur le circuit.

Suite à votre tour, deux cas de figure peuvent se présenter :

Il y a beaucoup d'herbe dans les champs et il est conseillé, une fois la période de transition terminée, d'augmenter rapidement la part de pâturage dans la ration en diminuant les apports à l'auge. Ceci permettra d'allier les deux objectifs cités ci-dessus : une fin au début avril et une hauteur sortie des parcelles à 4 cm herbomètre.

Il y a peu d'herbe ou le tour de déprimage est déjà bien avancé (moyenne des parcelles < 6cm herbomètre). Une ingestion limitée au pâturage permettra de s'assurer de ne pas finir trop tôt le premier tour ce qui risquerait d'engendrer du surpâturage sur le 2eme tour. Veillez à un temps de retour de l'ordre de 35/40 jours pour avoir un volume suffisant au deuxième passage.

En système allaitant, une sortie progressive des animaux en commençant par des lots peu fragiles (génisses pleines, vaches avec veaux d'automne...) permettra de créer là aussi un décalage entre les parcelles et d'autres animaux pourront les rejoindre sur le circuit une fois la croissance plus importante.

Respecter les transitions

Comme toutes les transitions, la mise à l'herbe est à faire progressivement. Une sortie d'après-midi sur une parcelle portante est conseillée avant d'allonger progressivement le temps en pâture. Pour faire face au transit qui va s'accélérer et aux excès d'azote soluble, un apport d'argile (type bentonite) est possible à 60-80g par animal et par jour.

Une complémentation en magnésium, sous forme d'oxyde de magnésie est aussi préconisée en cas de températures plus froides ou de transition rapide. Ceci évitera la carence en magnésium pouvant conduire à de la tétanie d'herbage.

Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Pays de la Loire

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr