


Et la pousse continue

- Ajuster le pâturage pour l'été
- Fauche des foins
- Dernier délai pour semis d'été

- Vaches allaitantes
- ★ Vaches allaitantes BIO
- Vaches laitières
- ☆ Vaches laitières BIO

| | Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 18/06 au 24/06 | Hauteur moyenne (cm) |
|---------------------------|--|----------------------|
| Zone Nord | 36 | 8,7 |
| Zone Intermédiaire | 47 | 9,4 |
| Zone Sud | Nord Loire | 33 |
| | Sud Loire | 38 |
| MOYENNE REGION | 36 | 9,0 |



La pousse continue cette semaine, bien qu'il y ait un ralentissement dans certaines zones. Le beau de cette semaine devrait permettre la continuité de la pousse.

Ajuster le pâturage pour l'été

La pousse continue et va probablement encore se prolonger quelques semaines. Nous observons des bonnes repousses d'herbe feuillues avec une augmentation de la part des légumineuses dans les prairies. Nous retrouvons donc des niveaux de qualité d'herbe qui ont pu manquer cette saison.

D'un point de vue ration, il est primordial de commencer par faire un tour des prairies pour voir ce que mangent les animaux et voir l'état des prairies. Tous les refus et épis n'ont pas toujours été fauchés. Pour ces exploitations-ci, le niveau d'ingestion n'est pas toujours suffisant.


Les repousses étant feuillues, il est encore temps de débrayer des surfaces pour faire des stocks sur pieds pour les exploitations ayant plus de 40 ares de surfaces pâturables par UGB. La réserve hydrique des sols étant toujours forte, la pousse l'herbe peut continuer quelques semaines. On gardera en priorité les parcelles les plus riches en légumineuses qui conservent une bonne valeur alimentaire plus longtemps. Avec la pousse actuelle, il faut une quarantaine de jours pour avoir un stock sur pied équivalent 1,5tMS/ha.

Fauche des foins

Les températures chaudes de cette semaine vont permettre au sol de se ressuyer après les gros orages de la semaine dernière. Cela laisse une possibilité de continuer les foins dès la fin de cette semaine ou de les commencer si ce n'est pas encore fait.

Dernier délai pour semis d'été

Il est encore temps de faire les semis de couvert d'été pour renouveler les prairies abimées. Pour faire pâturer à l'automne : colza fourrager ou mélanger colza-RGI. Ou pour faire pâturer en fin d'été : sorgho multicoupe avec une variété BMR. On évitera de faire des semis de couverts d'été après début juillet au risque de créer un trop gros décalage du cycle de développement de la culture par rapport à la rotation, sans compter sur le risque de sécheresse estivale qui freinerait fortement le développement du couvert.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE