


Une croissance en forte progression

- Pâturage de jour (et nuit)
- Recommandations pour la fauche

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 08/03 au 15/03	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	41	8,9
Zone Intermédiaire	54	9,5
Zone Sud	Nord Loire	47
	Sud Loire	52
MOYENNE REGION	47	10,9

Une portance qui s'améliore rapidement sur certaines parcelles, il est donc important de faire le tour très régulièrement des paddocks. Les mesures peuvent fortement varier d'une exploitation à une autre d'une même zone car les dates de mesure s'évalent du 18 au 25 mars.



Pâturage de jour et ou nuit

Nous avons déjà des stocks sur pied importants, à ceci s'ajoute une pousse de l'herbe soutenue autour des 60 kg de MS/Ha/jour.

Kg de MS permis en pâturage en fonction de la pousse et de la surface pâturable.

Croissance (kgMS/ha/j)	Chargement (ares disponibles/UGB)						
	20	25	30	35	40	50	60
20	4	5	6	7	8	10	12
25	5	6	8	9	10	13	15
30	6	8	9	11	12	15	18
35	7	9	11	12	14	18	21
40	8	10	12	14	16	20	24
50	10	13	15	18	20	25	30
60	12	15	18	21	24	30	36

Il est donc important d'anticiper le débrayage des paddocks déjà trop haut et ceux qui le seront lors du prochain tour. Avec une pousse de 60 kg nous gagnons presque 2 cm herbomètre par semaine, ce qui veut dire qu'une parcelle à 8 cm aujourd'hui sera à 12 cm dans 2 semaines.

Pour organiser le pâturage il est important :

- De créer le décalage de pousse entre les paddocks en conservant des paddocks avec des hauteurs différentes.
- De ne pas s'entêter sur des paddocks avec des hauteurs trop hautes. Le risque est d'engendrer un retard sur l'ensemble de la saison. Une herbe trop haute limite l'ingestion et sa valeur alimentaire s'en trouve fortement diminuée)
- De pâturer la nuit. Attention aux nuits froides amplifiant les risques de tétanie d'herbage, il est donc nécessaire de distribuer 50 gr d'oxyde de magnésium /VL/jour en ration de base.
- De préférence, distribuer la ration à l'auge le soir afin que le matin les vaches ne mangent que les restes le matin ce qui évitera qu'elles aient la panse trop pleine avant de sortir pâturer.
- Viser une hauteur de sortie au plus proche des 5 cm. Pour cela il est nécessaire de diviser les paddocks pour la surface nécessaire quotidienne. Voir photo ci-dessous pour le rendu d'un paddock bien divisé en condition de portance limitante.



En fait une fermeture des silos dès aujourd'hui semble un peu juste car l'herbe n'est pas encore assez riche en UFL et trop laxative, il faut donc bien veiller à une complémentation énergétique et de suffisamment de fibres.

Recommandations pour la fauche

2 types de prairies seront à faucher prochainement :

- Les RGI ou les épis montent dans la gaine rapidement (surtout sur les RGI 6 mois alternatifs et les méteils à base de seigle)
- Les parcelles du circuit du pâturage qui sont débrayées. S'il y a grand à débrayer, essayer de répartir les fauches sur 2 dates pour avoir une repousse échelonnée.

Attention : le stade du méteil dans les prairies semées sous couvert avance, mais il faut avant tout privilégier la prairie ce qui veut dire, ne surtout pas aller récolter en condition de portance limitante et la tasser dès la 1^{ère} année (au risque de voir lever des rumex, chardons, ...).

Concernant les hauteurs de fauche, il faut bien avoir en tête qu'une fauche haute (7 cm minimum) limitera le risque de ramasser de la terre lors de la récolte et donc de limiter le risque de butyriques. De plus elle permettra de récolter la meilleure partie de la plante. Dans l'idéal, le taux de matière sèche attendu se situe autour des 35% de MS, pour l'atteindre on privilégiera une fauche dès le matin après la rosée, en fauchant à plat dans l'idéal pour améliorer le contact « air-soleil » car ce sont les 6 premières heures de pré fanage qui sont les plus efficaces.

Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr